ПТИЦЫ

М.В. Яковлева

История изучения птиц заповедника и его окрестностей насчитывает около 150 лет. Зоологи и естествоиспытатели посещали территорию, прилегающую к водопаду Кивач, начиная с XIX века. Начало регулярным орнитологическим исследованиям было положено в 1958 г. Э.В. Ивантером и В.Б. Зиминым.

К настоящему времени в «Киваче» и его ближайших окрестностях зарегистрировано 218 видов птиц, принадлежащих к 17 отрядам; большинство — представители отрядов Воробьиные (94 вида), Ржанкообразные (37) и Пластинчатоклювые (25). Гнездование отмечено у 134 видов, однако один из них (серая куропатка) перестал регистрироваться в Карелии с 1960-х гг. На основании встреч токующих особей и территориальных пар можно предполагать гнездование ещё 19 видов. На пролете зафиксированы 45 видов, а случайные залёты отдельных особей на заповедную территорию отмечены ещё у 16. Только зимой в заповеднике можно увидеть *белую куропатку* и *олянку*.

В зимний период в «Киваче» зарегистрированы 63 вида птиц, но более или менее регулярно зимуют лишь около 20. Круглый год встречаются в лесу *глухарь*, *тетерев*, *рябчик*, *желна*, *большой пёстрый*, *белоспинный*, *трехпалый дятлы*, *пухляк*, *хохлатая синица* и *пищуха*, *ворон*. Скорее всего, к постоянно зимующим следует причислить и ряд сов, прежде всего *длиннохвостую неясыть*, *мохноногого* и *воробьиного сычей*. В некоторые годы в массе остаются на зиму *желтоголовые королюки*, но численность этой маленькой птички, плохо переносящей сильные морозы, значительно сокращается к весне. *Большие синицы* с холодами откочевывают из леса, многие из них держатся вблизи усадьбы и в посёлке заповедника. Здесь же в этот неблагоприятный период чаще всего можно увидеть *соек*.

В годы, урожайные на шишки ели, зимой встречаются *клесты*. В заповеднике отмечены на гнездовье все три вида клестов, обитающих в Карелии — *еловик*, *сосновик* и *белокрылый клёст*, но наиболее обычен первый. При обильном урожае ягод рябины на охраняемой территории зимуют питающиеся ими *свиристели*, *дрозды-рябинники*, *снегири*, а иногда даже *чёрные дрозды*. Однако по мере истощения ягодных запасов они покидают заповедник, и лишь снегири остаются до весны, переходя на другие корма. В годы, урожайные на семена берёзы и серой ольхи, в холодный период встречаются и *чечётки*, но чаще их можно увидеть на пролёте, ранней весной и поздней осенью. В среднем, зимой наибольшим обилием птиц отличаются ельники, наименьшим — сосняки. При этом в хвойных лесах по численности лидируют пухляк, хохлатая синица, большой пёстрый дятел, а в некоторые сезоны — клёст-еловик и желтоголовый королёк. Лиственные леса отличаются обилием чечётки, снегиря, рябчика, *длиннохвостой синицы* (она же *ополовник*), белоспинного дятла.

В целом орнитофауна заповедника характеризуется высоким разнообразием — в её составе, наряду с широко распространёнными птицами, присутствуют западноевропейские, сибирские и арктические виды. Здесь много птиц, находящихся у северного или южного предела распространения, для которых обычны такие признаки, как нерегулярность гнездования, спорадическое распространение, низкий уровень численности и большая амплитуда её изменений.

В «Киваче» зарегистрировано 38 птиц, включенных в Красную книгу Республики Карелия, 13 из них занесены и в Красную книгу Российской Федерации. Здесь обитает большое число видов, характерных именно для тайги: *бородатая неясыть*, *кукушка*, *свиристель*, *юрок*, *овсянка-ремез*, *белокрылый клёст*, *большой улит*, *таловка*. В связи с этим заповедник занесён в список *ключевых орнитологических территорий*, имеющих международное значение. На этом охраняемом участке гнездятся также локально редкие и

уязвимые птицы — *клуша*, трёхпалый дятел, *деряба*, клёст-сосновик, что делает его важным для их сохранения.

Большинство птиц заповедника — обитатели леса. При этом достаточно много водоплавающих и околоводных птиц. А вот видовой состав пернатых — обитателей болотных угодий обеднён в связи с небольшими размерами и облесённостью таких участков. Невелико и разнообразие птиц, населяющих антропогенный ландшафт. Гораздо лучше эта группа представлена в населённых пунктах и сельхозугодьях в окрестностях заповедника. Наиболее обычны на охраняемой территории *деревенская* и *городская ласточки*, *серая ворона*, *садовая славка*. Некоторые виды, характерные для южной Карелии, размножаются здесь нерегулярно (*полевой* и *домовый воробьи*, *сорока*, *скворец*) или же гнездятся лишь вблизи окрестных деревень (*полевой жаворонок*, *обыкновенная каменка*, *галка*).

Лесные массивы «Кивача» — преимущественно хвойные. Их отличает небольшая численность видов птиц южного происхождения, тяготеющих к лиственным лесам и полуоткрытым пространствам. В гнездовое время наиболее бедными по видовому разнообразию и количеству птиц являются чистые сосновые боры, в то время как березняки и осинники населены с наибольшей плотностью.

На охраняемой территории гнездится 3 вида тетеревиных: глухарь, тетерев и рябчик. Наиболее обычен рябчик, но численность его колеблется в довольно широких пределах. Глухарь немногочислен, его токовища располагаются обычно в сосновых борах вблизи болот. Весной на некоторых болотных угодьях собираются на тока тетерева, обычно не более 10–15 самцов. Чаще этот вид встречается в окрестностях заповедника, где лиственные и смешанные леса чередуются с вырубками и сенокосами. Местообитания, пригодные для размножения белой куропатки — обширные верховые болота, в «Киваче» отсутствуют. В очень небольшом количестве её регистрируют лишь зимой по берегам водоемов и на болотах.

В лесах «Кивача» обитают 7 видов дятлов. Из них на зиму улетает только *вертишейка*. Здесь она встречается преимущественно на пролёте и лишь небольшое количество птиц гнездится на вырубках и в сероольшаниках в окрестностях охраняемой территории. Наиболее многочислен большой пёстрый дятел, особенно в годы обильного урожая шишек хвойных пород. Если же шишки не уродились, эти дятлы могут к зиме почти полностью откочевать из заповедника. В лиственных и смешанных лесах, а также на приречных участках ельников, обитает белоспинный дятел — вид, включенный в Красную книгу Республики Карелия. Для его существования необходимо наличие старых лиственных деревьев, на стволах которых он кормится. По этой причине белоспинный дятел исчезает с территорий, подвергшихся рубкам; в заповеднике же его численность пока стабильна. В ельниках обычен трёхпалый дятел, особенно там, где много усыхающих елей, на которых он и кормится. Самый крупный дятел — желна — обитает в различных типах леса.

Наиболее велико разнообразие воробьиных птиц. Доминируют дендрофильные (предпочитающие деревья) виды. К числу фоновых можно отнести *зяблика*, *весничку*, *чижа*, *зарянку*. Менее многочисленны, но обычны в различных типах леса *лесной конек*, *мухоловка-пеструшка* и *серая мухоловка*, пухляк. В некоторые годы высока численность юрка, более характерного для северных районов Карелии. Однако этот вид может и полностью отсутствовать на гнездовье. Немногочисленна в разнообразных лесных сообществах пищуха, занимающая, как правило, участки, на которых имеются старые деревья и пни с трещинами или отставшей корой, где она и размещает свои гнёзда. Рябинник также может гнездиться во всех типах леса, но всегда неподалеку от водоёмов, полей или огородов, куда он вылетает кормиться.

Сосновые леса предпочитают *горихвостка-лысушка*, хохлатая синица, *деряба*, свиристель. Последний вид — обитатель северной тайги, и в «Киваче» гнездится не ежегодно. Число гнездящихся горихвосток сильно сократилось в 1980-х и особенно в

начале 1990-х гг., из-за чего этот вид был внесен в республиканскую Красную книгу. Но в настоящее время состояние её популяции не внушает опасений.

Гнездовые участки воронов также чаще всего располагаются в сосняках и десятилетия сохраняются постоянными. Так, в одном из гнёзд в Сопохском бору вороны размножаются уже более 30 лет. Изредка в борах селится *чечевица*, в основном предпочитающая антропогенный ландшафт. Здесь же обычно встречается и кукушка. Эта птица из-за осторожного поведения редко попадает на глаза в период размножения.

Ельники – основные места гнездования чижа, желтоголового короля, *лесной завирушки*, *певчего дрозда*, *малой мухоловки*. Прежде обычной птицей здесь была и *теньковка*, однако численность её в последние десятилетия сильно снизилась, и сейчас она отмечается лишь на пролете. *Зелёная пеночка* также предпочитает ельники. Этот вид находится в заповеднике вблизи северо-западной границы распространения. Он появился в «Киваче» лишь в конце 1970-х гг.; численность его значительно варьирует, и в некоторые годы здесь регистрируют лишь «бродячих» самцов, не имеющих гнездовых участков.

Для старовозрастных таёжных массивов заповедника характерно наличие ветровальных, захламленных участков. Здесь повышена плотность гнездования *крапивника*, *лесной завирушки*, *белобровика*, *веснички*. Там, где лес сильно заболочен, в так называемых «корбах», гнездится овсянка-ремез.

В лиственных лесах высока численность зяблика, *веснички*, *серой мухоловки*, *мухоловки-пеструшки*, *белобровика*, *зарянки*. Только здесь встречаются на гнездовье такие южные виды, как *ополовник*, *лазоревка*, *пересмешка*, *черноголовая славка*; в некоторые годы вполне обычной становится *пеночка-трещотка*. Вблизи рек и ручьев гнездится чёрный дрозд, также южный вид, поселившийся в заповеднике лишь в 1970-е гг. Изредка в березняках можно услышать *иволгу*.

На болотах наиболее обычны *жёлтая трясогузка*, *луговой чекан*, *камышовая овсянка*, *лесной конёк*. В некоторые годы здесь в массе гнездится и *луговой конёк*, однако временами он может и отсутствовать. На некоторых болотах выводит птенцов *сорокопут-жулан*. Эта птица обитает также на окрестных лугах и возле посёлка заповедника. В 1960-х гг. на болоте у границ «Кивача» наблюдали беспокоящуюся пару *большого*, или *серого сорокопута* — редкого вида, внесенного в Красную книгу Российской Федерации, что позволяет предположить его гнездование в заповеднике. Однако обычно эти птицы встречаются здесь лишь в период весеннего и осеннего пролёта, преимущественно в сельскохозяйственных угодьях.

На зарастающих тростником побережьях озер многочисленны *камышёвка-барсучок* и *камышовая овсянка*, а на слабо заросших берегах и островах — *белая трясогузка*. В охранную зону заповедника, в заросли кустарников по берегам водоёмов или на зарастающие луга иногда прилетает *соловей*, находящийся в наших краях вблизи северной границы ареала. В самом заповеднике соловьи появляются изредка, т.к. площадь их местообитаний здесь очень невелика.

В «Киваче» отмечено 17 видов хищных птиц и 9 видов сов, 6 из них — *скопа*, *орлан-белохвост*, *большой подорлик*, *беркут*, *сапсан* и *филин* — занесены в Красную книгу Российской Федерации. Рыбоядные хищники *скопа* и *орлан* регулярно гнездятся на заповедной территории. Охотящихся *скоп* можно наблюдать почти на всех озёрах и реках. В настоящее время известно одно жилое гнездо этого вида, но, судя по встречам птиц в сезон размножения, здесь обитают еще 1–2 пары. Скопы селятся на облесённых болотах, где строят гнёзда на вершинах наиболее высоких сосен. Орланы прежде регистрировались только на пролёте, но в конце 1990-х гг. одна пара поселилась на берегу Сундозера и с тех пор почти ежегодно выводит здесь птенцов. Увидеть *филина* — большая удача, но наличие токующих птиц позволяет предположить его размножение в заповеднике. *Большой подорлик*, *беркут* и *сапсан* отмечаются лишь в период миграций.

Наиболее обычными из хищных птиц являются *ястреб-перепелятник*, предпочитающий еловые леса, и *канюк*, обитающих вблизи лесных полян и опушек. В заповеднике гнездится несколько пар *ястребов-тетеревятников*. Этот вид, а иногда и перепелятник, остаются здесь на зиму. В последние десятилетия обычным гнездящимся хищником стал и *осоед*. Из соколов чаще других встречается *чеглок*, обычно селящийся в сосняках, граничащих с открытыми пространствами — озерами, болотами. *Пустельга*, в 1990-е гг. почти исчезнувшая, в настоящее время вновь появилась на полях в окрестностях заповедника. *Полевой лунь* также гнездится лишь на прилегающих открытых пространствах, посещая «Кивач» в период миграций. С появлением на ряде водоёмов густых тростниковых зарослей здесь появился и *болотный лунь*.

Наиболее многочисленные виды сов — длиннохвостая неясыть, мохноногий и воробьиный сычи. Последний вид чаще всего попадает на глаза осенью и зимой. В это время воробьиные сычи, как правило, держатся вблизи человеческого жилья, охотясь на обитающих здесь мелких птиц и млекопитающих. Довольно обычна в заповеднике и бородатая неясыть, здесь неоднократно отмечали её гнездование. На болотах изредка встречается *болотная сова*, этот вид более характерен для сельхозугодий в окрестностях «Кивача». Не исключено гнездование в охранной зоне заповедника *ушастой совы*. Этих птиц дважды отмечали здесь в сезон размножения, а в 30 км западнее её границ было найдено гнездо. Изредка в период кочёвок залетает в эти места и *ястребиная сова*.

В заповеднике гнездится 16 видов водоплавающих (2 вида гагар, 2 вида поганок и 12 видов пластинчатоклювых). Два из них — *краснозобая гагара* и *луток* — внесены в республиканскую Красную книгу. На крупных озёрах селится *чернозобая гагара*. Другая гагара — *краснозобая* появилась только в последние годы. В отличие от предыдущего вида она устраивает гнездо на мелких ламбушках, а за рыбой для птенцов летает на другие более крупные водоёмы. *Краснозобая гагара* — северный вид, и «Кивач» является одной из наиболее южных точек Карелии, где отмечено её размножение. На Пертозере, с чистой прозрачной водой и зарастающим побережьем, строят гнёзда *поганки* — *большая*, или *чомга*, которая поселилась в заповеднике около 30 лет назад, когда происходило её расселение на север, и более мелкая *серощёкая поганка*.

В последние десятилетия вновь отмечается гнездование на заповедной территории ещё одного вида из Красной книги Республики Карелия — *лебедя-кликуна*. Это одна из наиболее южных точек нашего края, где он размножается. Выводки лебедя отмечали как на крупных озёрах, так и на Сандалке и лесных ламбах. А осенью в мелководных заливах Сундозера стаи кормящихся лебедей могут насчитывать более 300 особей. Отдельные птицы задерживаются до самого ледостава, а иногда встречаются и зимой на незамерзающих порогах Суны.

Повсеместно обитает *кряква*. Особенностью заповедника по сравнению с прилегающими территориями является относительно высокая численность уток-дуплогнездников — *гоголя*, *большого крохали* и лутка. Причина этого в том, что в его старовозрастных лесах много дупел, пригодных для гнездования этих видов. Гоголь, наряду с кряквой, относится к наиболее многочисленным уткам заповедника и обитает на самых различных типах водоёмов. Большой крохаль встречается реже, в основном на Суне и озёрах, за исключением самых мелких. Луток, который ещё несколько десятилетий назад лишь изредка встречался на пролёте, стал в настоящее время довольно обычным на гнездовье, хотя и немногочисленным видом.

Нередок *чирок-свистунок*, предпочитающий мелкие водоемы — реки, ручьи, лесные ламбы. Много чирков селится в заводях, образовавшихся у построенных бобрами плотин. *Хохлатая чернеть* гнездится преимущественно на островках Сундозера, особенно охотно — в колониях чаек. В мае-июне на реках и зарастающих озёрах можно услышать резкие «взвизгивания» самцов *связи*. До 1980-х гг. эта утка встречалась лишь на пролёте, сейчас же это вполне обычный гнездящийся вид. На крупных озёрах (Сундозере, Мунозере) можно встретить выводки *среднего крохали*. А вот такие виды, как *чирок-*

трескунок, широконоска и шилохвость размножаются в заповеднике исключительно редко.

Наибольшим разнообразием водоплавающих отличается Сундозеро. Причем видовой состав различается в отдельных его частях: хохлатая чернеть, свиязь, кряква и гоголь держатся чаще в мелководных губах; большой и средний крохали, чернозобая гагара встречаются лишь в глубоководной части водоёма.

Численность многих видов водоплавающих за последние десятилетия возросла. Это произошло вследствие прекращения лесосплава по Суне и связанным с ней озёрам, обмелению и зарастанию многих водоёмов, что улучшило условия существования птиц.

Гуси, из которых наиболее многочисленны *гуменник* и *белолобый гусь*, в период пролёта проходят над территорией заповедника транзитом. Лишь изредка регистрируют остановки одиночных птиц и небольших групп на водно-болотных угодьях.

В заповеднике гнездятся 6 видов чаек. *Сизая чайка* обитает на всех типах водоёмов, а также на болотах. Остальные виды встречаются преимущественно на Сундозере. На его островах размножаются *клуша, серебристая, малая и озерная чайки, речная крачка*. Колонии последних трех видов в некоторые годы насчитывают сотни пар, но места их гнездовой очень непостоянны, по мере зарастания островков кустарником птицы перемещаются на другие территории.

Единственной цаплей, обитающей в «Киваче» и, судя по регулярным встречам токующих особей, гнездящейся здесь, является *выпь*. Это редкая в Карелии птица, характерная для более южных регионов. Она появилась лишь в последние годы, после образования на побережье Сундозера и некоторых окрестных водоёмов плотных зарослей тростника. Другой вид – *серая цапля* встречается в «Киваче» лишь во время послегнездовых кочёвок.

Число гнездящихся видов куликов невелико. Из лесных обычны *вальдиш и черныш*. *Перевозчик* обитает по заросшим лесом берегам самых различных водоёмов, а также на островах озёр. На безлесных островках и песчаных пляжах Сундозера отмечено размножение *малого зуйка*, а также редких в регионе — *кулика-сороки* (предположительно материковый подвид, внесённый в Красную книгу Российской Федерации) и *мородунки*. Однако в настоящее время побережье и острова интенсивно зарастают прибрежной растительностью и кустарником, что приводит к исчезновению этих видов. На заболоченных участках побережья и островов Сундозера встречается *чибис*, но более обычен он на лугах в окрестностях заповедника. На болотах обитают кулики *фифи, бекас и большой улит*. Число видов, зарегистрированных на пролёте, значительно шире. В этот период на берегах водоёмов можно встретить *тулеса, галстучника, щёголя, турухтана, круглоногого плавунчика, белохвостого песочника* и других куликов. Появляется здесь и *золотистая ржанка*, но чаще её стаи можно увидеть на окрестных полях.

В заповеднике зарегистрировано три вида журавлеобразных — *серый журавль, коростель и погоньш*. В последние годы вблизи его границ, на Мунозере, появилась на гнездовье еще и *лысуха*. Две-три пары журавлей выводят птенцов на наиболее крупных болотах. Коростель пока довольно обычен на полях в окрестностях, хотя в последние годы, после прекращения сенокосения, началось их интенсивное зарастание древесно-кустарниковой растительностью. На охраняемой территории пригодные для этого вида местообитания отсутствуют, и токующие самцы лишь в некоторые годы встречаются на пожнях и огородах усадьбы и жилого посёлка, а также на побережье Сундозера. Погоньш, видимо, изредка гнездится в заповеднике — токующих самцов и беспокоящихся птиц наблюдали на зарастающих побережьях озер и на Чечкином болоте.

На порогах Суны, которые не замерзают даже в самые холодные зимы, можно увидеть оляпок. Они живут в заповеднике лишь зиму, прилетая в конце октября–ноябре и улетаю в апреле. Здесь же в некоторые годы встречаются и водоплавающие. Чаще других

уток остаются на зимовку кряквы, но иногда здесь можно увидеть гоголей, больших крохалей и даже лебедя-кликуну.